Variables Aléatoires Discrètes

Pascal DELAHAYE - d'après le cours de David Delaunay

30 janvier 2025

Dans tout ce chapitre, on se place dans $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé avec Ω au plus dénombrable.

Table des matières

1 Variables Aléatoires (VA) Discrètes	1
2 Couple de variables aléatoires discrètes	10
3 Indépendance de variables aléatoires	12
4 Espérance	15
5 Variance d'une variable aléatoire réelle	21
6 Fonctions génératrices d'une VA naturelle	26

Voir les exercices de la banque CCINP de niveau MPSI : 95, 98, 104, 105, 107 et 109

1 Variables Aléatoires (VA) Discrètes

1. Définition :

DÉFINITION : Variable aléatoire

Une VA discrète définie sur Ω et à valeurs dans E est une application $X : \Omega \rightarrow E$ telle que :

- $X(\Omega)$ est au plus dénombrable ($X(\Omega)$ est appelé l'univers de la VA)
- Pour tout $x \in X(\Omega)$, $X^{-1}(\{x\}) \in \mathcal{A}$.
Cela signifie que les événements élémentaires de $X(\Omega)$ sont des événements de $(\Omega, \mathcal{A})$.

Remarques :

- $\triangle$ Une VA n'est ni une variable (car c'est une fonction) ni aléatoire (car parfaitement déterminée) !
C'est la valeur $\omega \in \Omega$ et donc celle de $X(\omega) = x \in X(\Omega)$ qui n'est connue qu'après réalisation de l'EA.
- $\heartsuit$ Une VA correspond à une façon particulière de regarder les résultats d'une EA.
- Lorsque la tribu est $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, la deuxième condition est automatiquement vérifiée.

Exemples :

- On lance deux dés et on s'intéresse :
 - à S la somme des deux valeurs obtenues
 - à P le produit des deux valeurs obtenues
 - à M le maximum des deux valeurs obtenues
- On tire avec remise n boules dans une urne contenant des blanches et des rouges en proportion p et $q = 1 - p$.
On peut s'intéresser :
 - à Nb le nombre de boules blanches obtenues lors d'un tirage est une VA discrète.
 - à X qui prend les valeurs $-1, 0$ et 1 et indique quelle couleur apparaît le plus souvent dans le tirage
- On lance indéfiniment un dé et on peut s'intéresser :
 - à X_n la valeur obtenue au nième lancer ((X_n) est alors une suite de VA discrètes.)
 - à R le rang d'apparition du premier 6
 - à S qui détermine si la suite 1-2-3-4-5-6 apparaît

Vocabulaire : Une variable aléatoire X $\left\{ \begin{array}{l} \text{d'univers } X(\Omega) = \{0, 1\} \text{ est appelée une } \textit{variable de Bernoulli} \\ \text{d'univers } X(\Omega) \subset \mathbb{R} \text{ est appelée une } \textit{variable aléatoire réelle} \\ \text{d'univers } X(\Omega) \subset \mathbb{N} \text{ est appelée une } \textit{variable aléatoire naturelle} \end{array} \right.$.

DÉFINITION : Variable indicatrice d'un événement

Sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

On définit la VA indicatrice de l'événement $A \in \mathcal{A}$ par : $\mathbf{1}_A : \begin{cases} \mathbf{1}_A(\omega) = 1 & \text{lorsque } \omega \in A \\ \mathbf{1}_A(\omega) = 0 & \text{lorsque } \omega \in \bar{A} \end{cases}$.

$\mathbf{1}_A$ est une variable de Bernoulli.

2. Événements usuels liés à une VA : Dans $(\Omega, \mathcal{A})$

DÉFINITION : Événements élémentaires de la variable aléatoire X

Il s'agit pour tout $x \in X(\Omega)$ de l'événement $X^{-1}(\{x\})$ noté :

$$(X = x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$$

L'événement $(X = x)$ est également parfois noté $\{X = x\}$.

Exemple : On lance deux dés et on considère X la somme des valeurs obtenues :

$$(X = 5) = \{(1, 4), (2, 3), \dots\}$$

DÉFINITION : Événement quelconque lié à la variable X

Pour tout $A \subset E$, on note $(X \in A)$ l'événement : $(X \in A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\} = X^{-1}(A)$

L'événement $(X \in A)$ peut se décomposer selon deux partitions "élémentaires" :

$(X \in A) = \bigcup_{x \in X(\Omega) \cap A} (X = x)$	<p>Décomposition en événements élémentaires associés à X</p> <p>Partition 1 de $(X \in A)$</p>
$(X \in A) = \bigcup_{\omega \in X^{-1}(A)} \{\omega\}$	<p>Décomposition en événements élémentaires de Ω (plus fine !)</p> <p>Partition 2 de $(X \in A)$</p>

Rappel : Reformulation d'un événement

Pour reformuler un événement A , on raisonne par équivalences successives.

Soit $\omega \in \Omega$, on a :

$$\omega \in A \iff \dots \iff \omega \in B \quad \text{et donc} \quad A = B$$

Plus rapidement, on s'autorise souvent à écrire : $A = \dots = B$.

PROPOSITION : Compatibilité avec les opérations ensemblistes

- $(X \in A \cap B) = (X \in A) \cap (X \in B)$
- $(X \in A \cup B) = (X \in A) \cup (X \in B)$
- $(X \in \bar{A}) = \overline{(X \in A)}$.

Preuve : En utilisant la méthode de reformulation évoquée précédemment.

DÉFINITION : Lorsque $E = \mathbb{R}$, on note : $(X \leq a) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq a\} = X^{-1}(] - \infty, a])$.

De même pour $(X < a)$, $(X \geq a)$...

Exemples : Soit X et Y deux variables aléatoires naturelles.

Déterminer une partition en événements élémentaires des événements : $\begin{cases} (X = Y) \\ (X > n_0) \end{cases}$

3. Loi d'une variable aléatoire discrète : Dans $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ discrète d'univers probabilisable $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$ associé.

DÉFINITION : La loi de probabilité de la variable aléatoire X est l'application :

$$P_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) \rightarrow [0, 1] \quad \text{définie par} \quad P_X(A) = P(X \in A)$$

On vérifie que P_X définit bien une probabilité sur l'espace probabilisable $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$.

Exemple : S la somme des faces obtenues lors du lancer de deux dés.

THÉORÈME : Construction de la loi d'une VA

La loi P_X sur $X(\Omega)$ est parfaitement déterminée par la distribution de probabilités discrète $(P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.

En pratique, on présente la loi de X en donnant uniquement les valeurs $p_x = P(X = x)$.

Attention

La connaissance de la loi P_X ne permet pas de déterminer X : $P_X = P_Y \not\Rightarrow X = Y$.

C/expl : On lance une pièce équilibrée et on définit X et Y par $\begin{cases} X = 1 \text{ si on a face et } 0 \text{ sinon} \\ Y = 0 \text{ si on a face et } 1 \text{ sinon} \end{cases}$.

On a alors $P_X = P_Y$ et pourtant $X \neq Y$.

Notation :

- Si $P_X = P_Y$, on notera $X \sim Y$ et on dira alors que « X suit la loi de Y ».
- Si X suit une loi de probabilité $\mathcal{L}$, on notera $X \leftrightarrow \mathcal{L}$ ou parfois $X \sim \mathcal{L}$.

Méthode : Déterminer la loi de X signifie

- Déterminer l'univers $X(\Omega)$
- Calculer $P(X = x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$

DÉFINITION : Loi conditionnelle sachant un événement

Soit X une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et A un événement de $\mathcal{A}$.

On appelle *loi conditionnelle de X sachant A* la loi définie par la distribution de probabilités discrète $(P_A(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.

4. Lois FINIES usuelles (MPSI) : X est une VA sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ fini.

Voici 2 fonctions python à connaître impérativement pour les simulations probabilistes :

```

Python
from random import randint    # randint(a,b) renvoie un entier entre a et b
from random import random     # random() renvoie un flottant entre 0 et 1

```

Les valeurs renvoyées par ces fonctions sont équiprobables.

- Loi uniforme :

DÉFINITION : Loi uniforme

On dit que X , telle que $\text{Card}(X(\Omega)) = n$, suit une loi uniforme lorsque pour tout $x \in X(\Omega)$:

$$P(X = x) = \frac{1}{n}$$

On note $X \leftrightarrow \mathcal{U}([a, b])$ la loi uniforme sur $[a, b]$ et $X \leftrightarrow \mathcal{U}(n)$ celle sur $[1, n]$.

Exemple : On lance un dé équilibré. X donnant valeur obtenue vérifie : $X \leftrightarrow \mathcal{U}(6)$.

Modélisation : On utilise une loi uniforme lorsque les valeurs prises par X sont jugées équiprobables.

```

Python
def Unif(a,b) :
    return randint(a,b)
# Loi uniforme sur l'ensemble [a,b]

```

```

Python
L = [3,8,13,26,55]

def Unif(L) :
    n = len(L)
    k = randint(0,n-1)
    return L[k]
# Loi uniforme sur l'ensemble L
# Choix équiprobable de l'indice

# Ou bien :
choice(L)
# Dans la bibliothèque random

```

- Loi de Bernoulli :

DÉFINITION : Loi de Bernoulli

On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$ lorsque :

$$X(\Omega) = \{0, 1\} \quad \text{et} \quad P(X = 1) = p$$

On note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$ cette loi.

Exemples :

- On tire une boule dans une urne qui contient des boules blanches et des boules rouges en proportion p et $q = 1 - p$. X prend la valeur 1 si la boule est blanche et 0 sinon. On a $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$.
- La variable $\mathbf{1}_A$ indicatrice d'un événement A est une variable de Bernoulli de paramètre $P(A)$

Modélisation : On utilise ces variables pour modéliser les expériences à deux issues : succès et échec.

```

Python
def Bernoulli(p) : # Loi de Bernoulli de paramètre p
    if random() < p : return 1
    else : return 0

```

- Loi binômiale :

DÉFINITION : Loi binomiale

On dit que X suit une loi binomiale de paramètre n et p lorsque :

$$X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \quad \text{et} \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

On note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

Exemple : une urne contient des boules blanches et des boules rouges en proportion p et $q = 1 - p$.

On tire n fois, successivement et avec remise, une boule.

X le nombre de fois où on a tiré une boule blanche : $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

Modélisation : ce type de loi se retrouve lorsqu'on effectue, de façon indépendante, n fois une même expérience aléatoire à deux issues et qu'on s'intéresse au nombre de succès (ou d'échecs). Par exemple dans le cas d'un tirage avec remise ou de lancers répétitifs d'un dé.

PROPOSITION : Modélisation usuelle d'une loi binomiale

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ des VA indépendantes vérifiant la même loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$.

La variable aléatoire $S_n = X_1 + \dots + X_n$ vérifie alors une loi binomiale de paramètre n et p .

Preuve : Par récurrence.

Pour la programmation Python, on utilise le modèle précédent.

```

Python
def Binom(n,p): # Loi binomiale de paramètres n et p
    c = 0 # Initialisation du compteur de succès
    for k in range(1,n+1) : # On effectue n expériences de bernoulli
        if random() < p : c = c + 1 # On compte les succès
    return c

```

5. Lois INFINIES usuelles (MP) : X est une VA discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

• Loi de Poisson :

Exemple : Atomes radioactifs dans la matière.

Dans une certaine quantité de matière on trouve $n \gg 1$ atomes radioactifs qui ont la probabilité p très faible de se désintégrer durant un laps de temps T , sachant qu'en moyenne on a λ désintégrations durant ce laps de temps. En supposant l'indépendance des désintégrations atomiques, il serait rigoureux de modéliser la nombre de désintégrations atomiques par une variable X suivant une loi binômiale n, p et dans ce cas $np = \lambda$. Seulement une telle modélisation rendrait les calculs difficiles et, comme le montre le théorème suivant, on préfère approximer cette loi par une loi de poisson de paramètre λ .

THÉORÈME : La loi de Poisson est la limite d'une loi binomiale

Soit X_n une VA telle que $\begin{cases} X_n \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p_n) \\ p_n \sim \frac{\lambda}{n} > 0 \end{cases}$ (ainsi $E(X_n) = n \cdot p_n \sim \lambda$) .

On a alors :

$$P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Cela signifie que pour n grand, une loi binomiale de moyenne λ peut-être approchée par une loi de Poisson de paramètre λ . Comme $n \gg 1$, cela ne se produit que si l'événement que l'on veut dénombrer est rare.

Preuve : Simple passage à la limite dans $\binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}$.

DÉFINITION : Loi de Poisson

On dit que X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ lorsque : $\begin{cases} X(\Omega) = \mathbb{N} \\ P(X = n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \end{cases}$.

Il s'agit bien d'une loi de probabilité que l'on note $\mathcal{P}(\lambda)$.

Modélisation :

Si durant un laps de temps, un phénomène se produit en moyenne λ fois, on modélise souvent la situation en disant que le nombre de fois où se produit ce phénomène durant ce laps de temps suit une loi de poisson de paramètre λ . Cette modélisation est d'autant plus valable que le phénomène peut se produire un grand nombre de fois, mais à une probabilité faible de se produire.

C'est par exemple le cas pour :

- le nombre de désintégrations radioactives par seconde dans un échantillon,
- la nombre d'ampoules qui éclatent sur un grand sapin de Noël,
- le nombre de passages journaliers sur une route,
- le nombre d'enfants dans une famille,
- le nombre d'accidents de la route sur une année...

```

Python
def P(lambda):          # Loi de poisson de paramètre lambda
    return Binom(10000, lambda/10000)

```

• Loi géométrique :

Exemple : on lance un dé (de proba p) jusqu'à obtenir 6 et on pose X le nombre de lancers nécessaires.

On a alors $P(X = n) = p(1 - p)^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On notera :

$$X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$$

DÉFINITION : Loi géométrique

On dit que X suit une loi de Géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$ lorsque $\begin{cases} X(\Omega) = \mathbb{N}^* \\ P(X = n) = p(1 - p)^{n-1} \end{cases}$.

Il s'agit bien d'une loi de probabilité que l'on note $\mathcal{G}(p)$.

Modélisation : Plus généralement, une VA de loi géométrique est utilisée pour évaluer le temps d'attente avant qu'un événement se réalise (suite de variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p .)

```

Python
def G(p):                # Loi géométrique de paramètre p
    n = 1                 # Compteur d'expériences réalisés
    while random() > p : n = n + 1 # On continue tant qu'il y a échec
    return n

```

Exemple : ♥ Lorsque $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$, nous avons $P(X \geq n) = (1 - p)^{n-1}$.

Preuve : L'événement $(X \geq n)$ signifie n'avoir obtenu que des échecs au $n - 1$ premiers lancers.

6. Variables aléatoires composées :

- A partir d'une seule VA : Soit X est une VA discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

PROPOSITION : Soit $u : X(\Omega) \rightarrow F$.

- Notation : La composée $Y = u \circ X$ est notée $Y = u(X)$.
- Propriété : $Y = u(X)$ est une nouvelle variable aléatoire sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Preuve : Montrons que $Y = u(X)$ est bien une VA discrète.

→ $Y(\Omega)$ est au plus dénombrable.

→ Les événements élémentaires ($Y = y$) sont bien des événements.

En effet, pour tout $y \in Y(\Omega)$, on a : $(Y = y) = \bigcup_{x \in X(\Omega) \mid u(x)=y} (X = x) \in \mathcal{A}$.

Exemples : pour X une VA réelle : $X^2, |X|, \frac{1}{X}, \sqrt{X}, aX + b \dots$

PROPOSITION : Loi de $Y = u(X)$

La loi de $Y = u(X)$ est déterminée par celle de X .

Pour tout $y \in Y(\Omega)$, on a :

$$P(Y = y) = P(u(X) = y) = P(X \in u^{-1}(\{y\}))$$

Exemples :

→ Déterminer la loi de probabilité de 2^X en fonction de celle de X .

→ Déterminer la loi de probabilité de X^2 en fonction de celle de X .

Exercice : 1

(*) Montrer que lorsque $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ alors $Y = n - X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, 1 - p)$.

COROLLAIRE : Lorsque $X \sim Y$, alors $u(X) \sim u(Y)$.

- A partir de plusieurs VA : Plus généralement on définit $Y = u(X_1, \dots, X_n)$.

Exemples : Pour X, Y et Z des VA discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A})$

- $U = X + Y + Z$
- $U = (X, Y)$
- $U = \min(X, Y, Z)$
- $U = \begin{pmatrix} X & Y \\ 0 & Z \end{pmatrix}$.

Exemple : Pour déterminer la loi de $U = \min(X, Y)$, on décompose :

$$\forall z \in U(\Omega), \quad (U = z) = ((X = z) \cap (Y = z)) \cup ((X = z) \cap (Y > z)) \cup ((X > z) \cap (Y = z))$$

- La loi de X détermine celle de $u(X)$,
- En revanche les lois de $X_1, X_2, \dots, X_n$ ne permettent pas (en général) de déterminer la loi de $U(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Il faudra, pour cela, connaître la loi conjointe, vue dans la partie suivante.

2 Couple de variables aléatoires discrètes

On se place dans $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

1. Loi conjointe : Soit $\begin{cases} X : \Omega \rightarrow E \\ Y : \Omega \rightarrow F \end{cases}$ deux VA discrètes.

DÉFINITION : Loi de (X, Y)

- La loi de probabilité de la VA discrète (X, Y) est appelée la *loi conjointe* de X et Y .
- L'événement élémentaires $(X, Y) = (x, y)$ est également noté :

$$((X, Y) = (x, y)) = (X = x) \cap (Y = y) = (X = x, Y = y)$$

- La loi de (X, Y) est déterminée par $P(X = x, Y = y)$ pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$.
- Lorsque $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ sont finis et petits, cette loi est représentée par un tableau de probabilités.

Exemples :

- On tire une carte dans un jeu de 32. X donne la hauteur et Y la couleur. $Z = (X, Y)$ détermine alors la carte tirée. Déterminer la loi conjointe.
- Une urne contient 2 boules rouges, une blanche et une noire. On tire 2 boules simultanément. X est le nombre de boules blanches et Y le nombre de boules noires. Déterminer la loi conjointe.

Remarque : la somme des valeurs du tableau représentant la loi conjointe donne 1.

2. Lois marginales :

DÉFINITION : Lois marginales

Soit $Z : \Omega \rightarrow E \times F$ une VA discrète.

On peut alors introduire X et Y tels que $Z = (X, Y)$.

Les lois de X et de Y sont appelées les *lois marginales* de (X, Y) .

PROPOSITION : La loi de $Z = (X, Y)$ détermine parfaitement ses lois marginales :

$$\forall x \in X(\Omega), \quad P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y) \quad (\text{De même pour } P(Y = y))$$

Remarque : Dans le tableau de la loi de (X, Y) , on obtient les lois marginales en sommant sur $\begin{cases} \text{les lignes} \\ \text{les colonnes} \end{cases}$.

Exemple : Reprendre l'exemple précédent.

Sauf si les VA sont indépendantes, les lois marginales ne suffisent pas pour déterminer la loi conjointe.

C/expl : prendre 2 tableaux différents donnant les mêmes lois marginales.

Exercice : 2

(♥) **Tiré de l'exercice 97 de la banque CCINP**

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ dont la loi est donnée par

$$P(X = j, Y = k) = \frac{(j+k)\left(\frac{1}{2}\right)^{j+k}}{e \cdot j!k!}$$

1. Vérifier que les probabilités élémentaires données définissent bien une loi de probabilité.
2. Déterminer les lois marginales de X et Y .
3. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

A retenir!

La loi conjointe (loi de (X, Y)) détermine les lois marginales (lois de X et de Y) mais pas l'inverse !

$$\forall x \in X(\Omega), \quad P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y)$$

3. Lois conditionnelles : Soit X et Y deux VA discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

DÉFINITION : Soit $x \in X(\Omega)$.

On appelle la loi conditionnelle de Y sachant $(X = x)$ la loi de probabilité définie par :

$\forall y \in Y(\Omega)$:

- $P_{(X=x)}(Y = y) = \frac{P((Y = y) \cap (X = x))}{P(X = x)}$ si $P(X = x) \neq 0$
- $P_{(X=x)}(Y = y) = P(Y = y)$ si $P(X = x) = 0$

On peut également définir la loi de Y sachant l'événement $X \in A$.

Remarque : Cette loi est parfaitement déterminée par la loi conjointe !

Exemple : Prendre un tableau quelconque donnant une loi conjointe.

PROPOSITION : $\left\{ \begin{array}{l} \text{la loi de } X \\ \text{les lois de } Y \text{ sachant } (X = x) \text{ pour tous les } x \in X(\Omega) \end{array} \right\}$ déterminent $\left\{ \begin{array}{l} \text{La loi conjointe} \\ \text{La loi de } Y \end{array} \right\}$

Preuve : Immédiat avec la formule de définition.

Exemple : Lorsque X est réelle, on peut s'intéresser à la loi de Y sachant $X \geq x_0$.

$$P_{X \geq x_0}(Y = y) = \frac{1}{P(X \geq x_0)} P\left(\bigcup_{x=x_0}^{+\infty} (X = x) \cap (Y = y)\right)$$

4. Vecteurs aléatoires : Généralisation à $X_1, \dots, X_n$ des VA discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

DÉFINITION : Vecteur et matrices aléatoires

$Z = (X_1, \dots, X_n)$ est une variable aléatoire appelée *vecteur aléatoire*.

- La loi de Z est appelée la "loi conjointe" des variables aléatoires X_k
- Les lois des X_k sont les "lois marginales" de Z .

On définit de même la notion de *matrice aléatoire* par $M = (X_{i,j}) \in \mathfrak{M}_{p,q}(\mathbb{E})$ où $(X_{i,j})$ est une famille de VA.

Exemples :

- La modélisation du lancer de n dés : $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$.
- La modélisation d'une averse sur une place : $T_n = (X_{i,j}^n)_{i,j}$.

Exemples : Dans certains exercices, on étudie les variables aléatoires $\begin{cases} R = \text{rg}(M) \\ T = \text{Tr}(M) \\ D = \det(M) \end{cases}$ où M est une matrice aléatoire.

3 Indépendance de variables aléatoires

1. Couple de variables aléatoires indépendantes : Soit X et Y deux VA discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

DÉFINITION : Couple de 2 variables aléatoires indépendantes

$\begin{cases} X \\ Y \end{cases}$ sont *indépendantes* lorsque les événements $\begin{cases} (X \in A) \\ (Y \in B) \end{cases}$ sont indépendants pour tout $\begin{cases} A \in \mathcal{P}(X(\Omega)) \\ B \in \mathcal{P}(Y(\Omega)) \end{cases}$.

Intuitivement, cela signifie que les valeurs prises par X ne sont pas influencées par celles prises par Y .

Notation : L'indépendance de X et de Y est notée $X \perp\!\!\!\perp Y$.

Exemples :

- 2 variables aléatoires relatives à deux expériences non liées sont généralement considérées comme indépendantes. Par exemple lorsqu'on lance deux dés indiscernables et que X est la valeur prise par le premier et Y celle prise par le deuxième.
- T_n et T_{n+1} dans la modélisation précédente de l'averse.

PROPOSITION : Si X et Y sont indépendantes, alors

- la loi de Y sachant $(X = x)$ est la loi de Y .
- les lois de X et de Y déterminent la loi conjointe.

D/ Immédiat.

THÉORÈME : Caractérisation de l'indépendance :

X et Y sont indépendantes $\iff P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y) \quad \forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$.

Preuve : En effectuant une sommation par paquets dans la réciproque.

Exemple : Montrer qu'une variable aléatoire constante est indépendante de tout autre variable aléatoire.

Exemple : Les variables X et Y de loi conjointe suivante sont-elles indépendantes ?

	$X = 0$	$X = 1$
$Y = 0$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$
$Y = 1$	$\frac{3}{12}$	$\frac{6}{12}$

Exercice : 3

(*) Une urne 1 contient 2 blanches et 3 noires et une deuxième l'inverse.
On jette une pièce. Si on a "face" on pioche une boule dans l'urne 1 et sinon on pioche dans l'urne 2.
Soit X la valeur de la pièce et Y la couleur de la boule tirée.
Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

PROPOSITION : $X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow u(X) \perp\!\!\!\perp v(Y)$

Preuve : $(u(X) = a) \cap (v(Y) = b) = (X \in u^{-1}(\{a\})) \cap (Y \in v^{-1}(\{b\}))$.

Exemples : Si X et Y sont indépendantes, alors $\begin{cases} aX + b \text{ et } cY + d \\ X^2 \text{ et } \cos(Y) \\ t^X \text{ et } t^Y \end{cases}$ sont indépendantes.

Décompositions usuelles d'événements

Lorsque $X(\Omega) = Y(\Omega) = \mathbb{N}$.

- $(X \geq x_0) = \bigcup_{x \geq x_0} (X = x)$
- $(X = Y) = \bigcup_{n=0}^{+\infty} (X = n) \cap (Y = n)$
- $(\min(X, Y) = n) = ((X = n) \cap (Y = n)) \cup ((X = n) \cap (Y > n)) \cup ((X > n) \cap (Y = n))$
- $(X + Y = n) = \bigcup_{k=0}^n (X = k) \cap (Y = n - k)$

Exercice : 4

(*) Comment obtenir la loi de $Z = \min(X, Y)$ lorsque X et Y sont deux VA d'univers $\mathbb{Z}$?

- Avec la loi conjointe ?
- Lorsque X et Y sont indépendantes ?

Exercice : 5

(*) Soit X et Y deux VA indépendantes suivant des lois géométriques de paramètre λ et μ .
Déterminer la loi de :

- $Z = X + Y$.

- $Z = \min(X, Y)$.

Voir l'exercice 103 de la banque CCINP.

2. Famille finie de variables (mutuellement) indépendantes :

DÉFINITION : Soit $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de VA discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

On dira que les variables X_i sont (mutuellement) indépendantes lorsque tous les événements $(X_i \in A_i)$ sont (mutuellement) indépendants.

THÉORÈME : Caractérisation de l'indépendance :

"les variables X_i sont indépendantes" $\iff P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{k=1}^n P(X_k = x_k), \quad \forall (x_1, \dots, x_n)$

Remarque : Lorsqu'on répète n fois une même expérience aléatoire en notant X_k les résultats successifs obtenus, il est usuel de considérer les variables X_k comme indépendantes.

Exemple : On tire des boules dans une urne contenant des blanches et des rouges.

On note X_i la variable aléatoire qui donne la couleur de la boule obtenue au i ème tirage.

- Si les tirages se font avec remise, on considère les X_i mutuellement indépendantes.
- Sinon elles ne le sont pas.

Remarque : L'indépendance est distincte de l'indépendance 2 à 2.

THÉORÈME : Lemme des coalitions

Si $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes, alors :

- Toute sous-famille est constituée de VA indépendantes.
- Les 2 variables aléatoires $\begin{cases} X = f(X_1, \dots, X_p) \\ Y = g(X_{p+1}, \dots, X_n) \end{cases}$ sont indépendantes.
- Les n variables aléatoires $u_1(X_1), \dots, u_n(X_n)$ sont indépendantes.

Preuve : Avec sommation par paquets, on calcule :

$$P(X = x, Y = y) = \sum_{(x_1, \dots, x_p) \in f^{-1}(\{x\}), (x_{p+1}, \dots, x_n) \in g^{-1}(\{y\})} P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = ..$$

On peut déterminer la loi de $S_n = X_1 + \dots + X_n$ par récurrence lorsque les variables X_k sont indépendantes. Voir l'application de cette méthode à la modélisation de la loi binômiale.

3. Famille infinie de variables (mutuellement) indépendantes :

DÉFINITION : Soit $(X_i)_{i \in I}$ une famille de VA discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

On dit que les X_i sont (mutuellement) indépendantes lorsque les VA de tout sous-ensemble fini de cette famille sont (mutuellement) indépendantes.

Exemple : On lance une pièce indéfiniment.

On note X_k est la variable de bernoulli qui donne 1 si on obtient FACE au kième lancer.

On considère usuellement que la famille (X_k) est une famille de VA indépendantes.

Remarque : Pour assurer un cadre probabiliste à la répétition indépendante d'une même EA une infinité de fois, nous admettrons qu'il existe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ sur lequel il existe une famille $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de VA discrètes indépendantes qui sont toutes de même loi $\mathcal{L}$ ou de lois distinctes $\mathcal{L}_n$.

Exemple :

Il existe un espace probabilisé sur lequel il est possible de définir une suite de variables aléatoires indépendantes $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suivant toute la même loi $\mathcal{B}(p)$. Il est ainsi possible de modéliser un jeu infini de "Pile ou Face" de lancers indépendants.

4 Espérance

Dans cette partie, les variables aléatoires sont supposées discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Introduction :

DÉFINITION : **Espérance d'une variable positive**

Soit X une variable aléatoire discrètes à valeurs dans $\mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$

L'espérance de X est définie par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$$

On a $\mathbb{E}(X) = +\infty$ lorsque la famille $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ n'est pas sommable.

Remarque : Lorsque $X(\Omega) = \mathbb{N}$, on a : $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} nP(X = n)$ avec $\mathbb{E}(X) = +\infty$ en cas de divergence.

Exemples :

- Pour une variable X de loi $\begin{cases} X(\Omega) = \mathbb{N}^* \\ P(X = n) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \end{cases}$, on a : $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} = +\infty$.
- Pour une variable X de loi $\begin{cases} X(\Omega) = \mathbb{N} \\ P(X = n) = \frac{1}{2^{n+1}} \end{cases}$, on a : $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{2^{n+1}}$.

DÉFINITION : Espérance d'une variable numérique

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$.

On dit que X est d'espérance finie lorsque la famille $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable.

On a alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$$

Notation : On note L^1 l'ensemble des variables aléatoires admettant une espérance finie.

Méthode pour vérifier d'une VA est d'espérance finie

On calcule directement $\sum_{x \in X(\Omega)} |x|P(X = x)$ avec la formule de sommation par paquets.

Si le résultat aboutit à une valeur finie, c'est que X est d'espérance finie.

On peut alors calculer son espérance à l'aide de la formule :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$$

THÉORÈME : Formule lorsqu'on dispose d'une énumération

On introduit une numération de $X(\Omega)$ et on a alors $X(\Omega) = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ et :

X admet une espérance ssi $\sum_{n \geq 0} x_n P(X = x_n)$ est absolument convergente et alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n P(X = x_n) \quad + \quad \text{sommation par paquets}$$

Remarques :

- L'espérance dépend uniquement de la loi de probabilité de X .
En d'autres termes, deux VA distinctes mais suivant une même loi de probabilité ont la même espérance.

Exemple : Pour $t \in \mathbb{R}$, calculer $E(\sin(Xt))$ lorsque X et $-X$ suivent la même loi.

- $\mathbb{E}(X)$ est une CONSTANTE et non une VA dépendant de X comme c'est le cas pour la notation $u(X)$

PROPOSITION : VA constante ou presque sûrement constante

Soit $a \in \mathbb{C}$.

- Lorsque $X(\Omega) = \{a\}$, on dit que X est une VA constante notée habituellement a .
Lorsqu'il existe $a \in X(\Omega)$ tel que $P(X = a) = 1$, on dit que X est une VA presque sûrement constante égale à a .
- Dans les deux cas, nous avons alors :

$$\mathbb{E}(a) = a$$

En particulier : $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X)$.

Exercice : 6

(*) Mines 2018 - Q^o1 épreuve écrite

Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$ et $m \in \llbracket 2, n \rrbracket$.

Montrer que $\mathbb{E}(X) \leq m - 1 + nP(X \geq m)$.

Exemples : A connaître par coeur!!

Lorsque : X est constante à C	on a $\mathbb{E}(X) = C$
Lorsque : $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$	on a $\mathbb{E}(X) = \frac{1+n}{2}$
Lorsque : $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$	on a $\mathbb{E}(X) = p$
Lorsque : $X = 1_A$	on a $\mathbb{E}(1_A) = P(A)$
Lorsque : $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$	on a $\mathbb{E}(X) = np$
Lorsque : $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$	on a $\mathbb{E}(X) = \lambda$
Lorsque : $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$	on a $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$

Preuve :

Ces valeurs s'obtiennent très facilement à l'aide des fonctions génératrices vues en fin de chapitre.

On peut également les déterminer avec la formule de définition ou parfois en utilisant la linéarité de l'espérance.

Voir les exercices 102, 103, 106 et 111 de la banque CCINP.

PROPOSITION : Espérance d'une VA naturelle

Lorsque X est une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, on a :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X \geq n)$$

Cette formule reste valable en cas d'espérance infinie.

Preuve : Il suffit de calculer $\sum_{n=1}^{\infty} P(X \geq n)$ en décomposant $(X \geq n) = \bigcup_{k=n}^{+\infty} (X = k)$ et en échangeant les sommes.

Méthode de calcul de $\mathbb{E}(X)$ lorsque $X(\Omega) = \mathbb{N}$

Si l'expression de $P(X \geq n)$ est simple à obtenir.

- On calcule $P(X \geq n)$

- On applique la formule : $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X \geq n)$

Exemple : Calculer l'espérance de $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$.

Exercice : 7

(♥) On lance une pièce équilibrée jusqu'à ce que celle-ci ait produit au moins une fois Face et une fois Pile. Déterminer l'espérance de X où X renvoie le nombre de lancers effectués.

DÉFINITION : Lorsque X admet une espérance et que $\mathbb{E}(X) = 0$, on dit que X est une VA centrée.

2. Formule de transfert :

THÉORÈME : Formule de transfert

Soit X une VA et $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$.

$$Y = f(X) \text{ admet une espérance} \iff (f(x)P(X = x))_{x \in X(\Omega)} \text{ est sommable}$$

Et dans ce cas :

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x)$$

Preuve : On calcule $\mathbb{E}(|f(X)|)$ par calcul direct en décomposant l'événement $(f(X) = y) = \bigcup_{x \in X(\Omega) \mid f(x)=y} (X = x)$.

La double somme obtenue donne $\sum_{x \in X(\Omega)}$ et on obtient ainsi l'équivalence.

On reprend alors le calcul précédent sans les valeurs absolues pour obtenir $E(f(X))$.

Exemples : Pour $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket -1, 1 \rrbracket)$, calculer $\mathbb{E}(X^2)$, $\mathbb{E}(\sin(\frac{\pi}{2}X))$ et $\mathbb{E}(\int_0^1 (t + 1)X dt)$.

Méthode de calcul de $\mathbb{E}(XY)$

On applique la formule de transfert à la variable $Z = (X, Y)$:

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xyP(X = x, Y = y)$$

Exercice : 8

(*) Soit X une variable aléatoire naturelle de loi définie par $P(X = n) = \frac{4(n + 1)}{3^{n+2}}$.

Montrer que $Y = \frac{e^X}{X + 1} \in L^1$ et calculer $E(Y)$.

Preuve : Comme $Y \geq 0$, on calcule directement : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^n}{n + 1} P(X = n) = \dots$

COROLLAIRE : $X \in L^1 \iff |X| \in L^1$

3. Propriétés :

PROPOSITION : Linéarité :

Si X et Y admettent des espérances, alors $\begin{cases} \lambda X \\ X + Y \end{cases}$ aussi et $\begin{cases} \mathbb{E}(\lambda X) = \lambda \mathbb{E}(X) \\ \mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) \end{cases}$.

En particulier :

- $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$
- $Y = X - \mathbb{E}(X)$ est une VA centrée.

Preuve : Pour $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$ on applique la formule de transfert à la variable aléatoire $Z = (X, Y)$. On commence par supposer que $X(\Omega), Y(\Omega) \subset \mathbb{R}^+$ afin de vérifier la sommabilité. Le cas général s'en déduit alors facilement.

Méthode d'utilisation de la linéarité

On pourra directement appliquer la formule $\mathbb{E}(\lambda X + \mu Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y)$.
Si le résultat aboutit à une valeur finie, c'est que le calcul était légitime.

Remarques :

- L^1 est un sev de $\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K})$.
- L'application $X \mapsto \mathbb{E}(X)$ est une forme linéaire.
- $\{X \mid \mathbb{E}(X) = 0\}$ est un hyperplan de ce $\mathbb{R}$ -ev.

Exemples :

- Déterminer l'espérance de X telle que $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et $P(X = n) = (1 - p)^n p$.

- Déterminer l'espérance de X telle que $X \hookrightarrow \mathcal{U}(a, b)$.

PROPOSITION : Positivité et croissance

Soit $X, Y \in L^1$.

- Si $X \geq 0$ alors $\begin{cases} \mathbb{E}(X) \geq 0 \\ \mathbb{E}(X) = 0 \Rightarrow P(X = 0) = 1 \end{cases}$ (X est presque sûrement nulle)
- Si $X \leq Y$ alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.
- $E(X) \leq E(|X|)$

PROPOSITION : Comparaison

$$|X| \leq Y \quad \text{avec} \quad Y \in L^1 \quad \Rightarrow \quad X \in L^1$$

Et dans ce cas, nous avons $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(Y)$.

♡ Toute variable aléatoire bornée admet donc une espérance.

Preuve : On applique la formule de transfert à la variable $u(X, Y) = |X|$.

Cette variable étant positive, on peut procéder à un calcul direct puis à une majoration.

Attention à justifier correctement que $|x| \leq y$ en remarquant que $(x, y) = (X(\omega), Y(\omega))$.

4. Inégalité de Markov :
THÉORÈME : Inégalité de Markov

Lorsque $\begin{cases} X \in L^1 \\ X \geq 0 \\ a > 0 \end{cases}$ alors : $P(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$

Preuve :

M1 : Par le calcul en minorant $\mathbb{E}(X)$

M2 : En remarquant que $\mathbf{1}_{(X \geq a)} \leq \frac{X}{a}$ et en utilisant la croissance de l'espérance.

Autres formes utilisées : $P(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}(X)|)}{\varepsilon}$ ou encore $P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(X^2)}{\varepsilon^2}$.

Exemples : Pour $a > 0$ et X admettant une espérance, $\begin{cases} \text{majorer } P(X - \mathbb{E}(X) \geq a) \\ \text{minorer } P(|X - \mathbb{E}(X)| < a) \end{cases}$

Méthodes de majoration d'une probabilité

Pour majorer $P(X \in A)$:

- M1 : On peut rechercher un événement B tel que $(X \in A) \subset (X \in B)$ et on obtient :

$$\mathbb{P}(X \in A) \leq \mathbb{P}(X \in B)$$

- M2 : On peut utiliser Markov en vérifiant bien les hypothèses d'application :

$$(X \in A) \iff \dots \iff (u(X) \geq a) \quad \text{et donc} \quad P(X \in A) \leq \frac{\mathbb{E}(u(X))}{a}$$

- M3 : Comme M2 mais en utilisant l'inégalité de BienAymé Tchebychev.

5. Variables indépendantes :

THÉORÈME : Espérance d'un produit

- Lorsque $X, Y \in L^1$ sont indépendantes, on a :

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

- Plus généralement, lorsque $X_1, \dots, X_n \in L^1$ sont indépendantes, on a :

$$\mathbb{E}(X_1 X_2 \dots X_n) = E(X_1)E(X_2) \dots E(X_n)$$

Preuve :

- On calcule $\mathbb{E}(|XY|)$ avec la formule de transfert appliquée à $|XY| = f(X, Y)$ et une sommation par paquets :

$$\mathbb{E}(|XY|) = \sum_{(x,y) \in (X,Y)(\Omega)} |xy|P(X=x, Y=y) = \sum_{(x,y) \in (X,Y)(\Omega)} |xy|P(X=x)P(Y=y) = \sum_{x \in X(\Omega)} |x|P(X=x) \sum_{y \in X(\Omega)} |y|P(Y=y)$$

Comme $|XY| \geq 0$, le calcul aboutissant à une valeur finie, on en déduit que $XY \in L^1$.

- On peut alors reprendre le calcul précédent en enlevant les valeurs absolues pour calculer $\mathbb{E}(XY)$.

Remarque : la réciproque est fausse.

■ **Exercice : 9** ■

(*) On lance une pièce équilibrée afin de faire avancer un pion sur un jeu de plateau.

Si on a PILE, le pion reste sur place mais tant qu'on a FACE, on jette un dé et on avance le pion de la valeur obtenue.

De combien le personnage avance-t-il en moyenne ?

COROLLAIRE : Si $\begin{cases} X \\ Y \end{cases}$ sont indépendantes et $\begin{cases} f(X) \\ g(Y) \end{cases}$ admettent des espérances, alors :

$$\mathbb{E}(f(X)g(Y)) = \mathbb{E}(f(X))\mathbb{E}(g(Y))$$

■ **Exercice : 10** ■

(♥) Déterminer $\mathbb{E}(e^{S_n})$ lorsque $X_1, \dots, X_n \in L^1$ sont des VA indépendantes de loi $\mathcal{U}(n)$ et $S_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$.

■ **Exercice : 11** ■

(♥) Déterminer $\mathbb{E}(\det(M))$ où $M = (m_{i,j}) \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ avec pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $m_{i,j} \hookrightarrow B(p)$.

5 Variance d'une variable aléatoire réelle

Dans cette partie, les variables aléatoires sont supposées discrètes et REELLES sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$

1. Espace L^2 :

Notation : Lorsque X^2 admet une espérance finie, on note $X \in L^2$.

Une analogie peut-être faite entre cet ensemble et les espaces $l^2(\mathbb{K})$ et $L^2(I, \mathbb{K})$.

PROPOSITION : L'espace vectoriel L^2

- $X \in L^2 \Rightarrow X \in L^1$ (L^2 est alors un sev de L^1)
- $X, Y \in L^2 \Rightarrow XY \in L^2$

Preuve : Avec le théorème de comparaison et $|X| \leq \frac{1}{2}(1 + X^2)$ et $|XY| \leq \frac{1}{2}(X^2 + Y^2)$.

THÉORÈME : Cauchy-Schwarz pour l'espérance

Lorsque $X, Y \in L^2$, on a : $|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)}\sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}$

Il y a égalité si et seulement si X et Y sont presque sûrement colinéaires.

Preuve : On montre l'inégalité en introduisant $f(t) = E((X + tY)^2)$ et en s'inspirant de Cauchy-Schwarz.
 Pour l'égalité :

- Pour le sens direct, pas de problème.
- Pour le sens indirect, on montre que si $P(X = -\lambda Y) = 1$ alors $f(-\lambda) = 0$ et donc $\Delta = 0$.

Exercice : 12

(♥♥) **Inégalité de Paley-Sigmund** (Oral Mines-Pont PSI)

Soit $X \in L^2$ positive et $a \in]0, 1[$.

1. Montrer que $X = X \cdot 1_{\{X < a\mathbb{E}(X)\}} + X \cdot 1_{\{X \geq a\mathbb{E}(X)\}}$
2. Montrer que :
 - $\mathbb{E}(X \cdot 1_{\{X < a\mathbb{E}(X)\}}) \leq a\mathbb{E}(X)$
 - $\mathbb{E}(X \cdot 1_{\{X \geq a\mathbb{E}(X)\}}) \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)} \cdot \sqrt{P(X \geq a\mathbb{E}(X))}$
3. En déduire que : $P(X \geq a\mathbb{E}(X)) \geq (1 - a)^2 \frac{\mathbb{E}(X)^2}{\mathbb{E}(X^2)}$

2. Variance et écart-type :

DÉFINITION : Variance et écart-type d'une VA réelle

Si $X \in L^2$ alors :

$$V(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) \quad \text{et donc} \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)} \quad \text{existent et sont finis}$$

- $V(X)$ est appelée la *variance* de X
- $\sigma(X)$ est appelé l'*écart-type* de X .

$\left\{ \begin{array}{l} \text{La variance } V(X) \\ \text{L'écart-type } \sigma(X) \end{array} \right.$ sont des indicateurs de la dispersion des valeurs de X autour de $\mathbb{E}(X)$.

Remarque : $X(\omega)$, $\mathbb{E}(X)$ et $\sigma(X)$ s'expriment dans la même unité.

Voir l'exercice 100 de la banque CCINP.

PROPOSITION : Variance nulle

Pour $X \in L^2$: $V(X) = 0 \iff X$ est presque sûrement constante

D/ Pas de difficulté.

THÉORÈME : Formule de Koenig-Huyghens n° 1

Pour $X \in L^2$: $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$

D/ Facile avec la linéarité.

Méthode de calcul de $V(X)$ avec $\mathbb{E}(X(X-1))$

Il est souvent plus facile de calculer $\mathbb{E}(X(X-1))$ que $\mathbb{E}(X^2)$.
 Pour obtenir $V(X)$, on remarque que :

$$\mathbb{E}(X(X-1)) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X) \quad \text{et donc} \quad V(X) = \mathbb{E}(X(X-1)) + \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)^2$$

Exemples : A connaître par coeur !!

Lorsque	X est constante	on a :	$V(X) = 0$
Lorsque	$X \hookrightarrow \mathcal{U}(n)$	on a :	$V(X) = \frac{n^2-1}{12}$
Lorsque	$X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$	on a :	$V(X) = pq$
Lorsque	$X = \mathbf{1}_A$	on a :	$V(\mathbf{1}_A) = P(A)(1 - P(A))$
Lorsque	$X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$	on a :	$V(X) = npq$
Lorsque	$X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$	on a :	$V(X) = \lambda$
Lorsque	$X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$	on a :	$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$

Preuve :

- Ces différentes valeurs s'obtiennent facilement à l'aide des fonctions génératrices.
- Sinon, on peut également utiliser la formule de Koenig-Huyghens.
 Pour les lois de Poisson et Géométrique, on obtient $\mathbb{E}(X^2)$ à l'aide de $\mathbb{E}(X(X-1))$.

THÉORÈME : Formule

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

D/ Simple calcul avec la formule de Koenig-Huyghens.

Exemple : Calculer la variance de $X \hookrightarrow \mathcal{U}(a, b)$.

DÉFINITION : Variable centrée réduite

- On dit qu'une variable aléatoire X est *réduite* lorsque $V(X) = 1$.
- *Réduire* une variable aléatoire X consiste à s'intéresser à $Y = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$.
- *Centrer et réduire* une variable aléatoire X consiste à s'intéresser à $Y = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$.

Voir l'exercice 108 de la banque CCINP.

3. Covariance :

DÉFINITION : Covariance

Si $X, Y \in L^2$, on définit : $cov(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y)))$ existe.

On remarque que $cov(X, X) = V(X)$.

D/ $|XY| \leq \frac{1}{2}(X^2 + Y^2)$.

PROPOSITION : FBS-Positive

- La covariance est une forme $\begin{cases} \text{bi-linéaire} \\ \text{symétrique} \\ \text{positive} \end{cases}$ sur l'EV des VA réelles admettant un moment d'ordre 2.
- En revanche, nous n'avons pas le caractère "défini" :

$$\text{cov}(X, X) = 0 \iff V(X) = 0 \iff X \text{ est presque sûrement constante}$$

Il s'en est donc fallu de peu pour que l'application σ soit une norme euclidienne.

D/ facile.

THÉORÈME : Formule de Koenig-Huyghens n°2

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

D/ Simple calcul.

THÉORÈME : Cas de 2 VA indépendantes

$$\begin{cases} X \\ Y \end{cases} \text{ indépendantes} \Rightarrow \text{cov}(X, Y) = 0$$

D/ Immédiat car dans ce cas, $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

THÉORÈME : Majoration

$$|\text{cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$$

D/ A partir de la définition, c'est une conséquence immédiate de l'inégalité de Cauchy-Schwarz vue précédemment.

DÉFINITION : Coefficient de corrélation linéaire

- Lorsque les variances de X et de Y sont non nulles on définit :

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} \in [-1, 1]$$

- On dira que $X, Y \in L^2$ sont *décorrélées* lorsque $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Remarques :

- Si X et Y sont indépendantes, ce coefficient est nul.
- Si X et Y sont liés par une relation affine, ce coefficient vaut ± 1 .

Exemple : Comment mesurer la corrélation entre deux VA réelles a priori liées par une relation de la forme $Y = X^2 + 1$?

4. Variance d'une somme :

THÉORÈME : Formule

$$V(X + Y) = V(X) + 2cov(X, Y) + V(Y)$$

D/ Simple calcul en utilisant $V(X, Y) = cov(X + T, X + Y)$.

THÉORÈME : Formule générale

$$V\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} cov(X_i, X_j) = \sum_{k=1}^n V(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} cov(X_i, X_j)$$

Preuve : Simple calcul en utilisant la bi-linéarité de la covariance : $V\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = cov\left(\sum_{k=1}^n X_k, \sum_{k=1}^n X_k\right)$.

COROLLAIRE : Variance de n variables aléatoires décorréllées

Lorsque pour tout $i \neq j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $cov(X_i, X_j) = 0$, on a :

$$V\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n V(X_k)$$

C'est en particulier le cas lorsque les VA sont indépendantes.

Exemple : Déterminer la variance de $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

5. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev :**THÉORÈME : Bienaymé-Tchebychev**

Lorsque $X \in L^2$, pour $\varepsilon > 0$, on a :

$$P(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$

Preuve : Application de Markov à $Y = (X - \mathbb{E}(X))^2$ et $a = \varepsilon^2$.

Cette majoration permet de savoir dans quel mesure le résultat d'une expérience peut s'écartier de la moyenne.

Exercice : 13

(*) Soit X une variable aléatoire réelle discrète admettant une variance σ^2 .

Montrer que $\forall \alpha > 0$, $P(|X - \mathbb{E}(X)| < \alpha\sigma) \geq 1 - \frac{1}{\alpha^2}$.

Exercice : 14

(*) Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une familles de variables aléatoires réelles centrées et indépendantes de L^2 .

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = X_1 + \dots + X_n$.

Montrer que pour tout $\begin{cases} n \in \mathbb{N}^* \\ x \in \mathbb{R}^{++} \end{cases}$, on a $P\left(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq x\right) \leq \frac{n}{x^2} \sum_{k=1}^n V(X_k)$.

THÉORÈME : Loi faible des grands nombres

Soit (X_n) une suite de VA deux à deux indépendantes.

On suppose que ces VA suivent la loi d'une variable $X \in L^2$.

On note $S_n = X_1 + \dots + X_n$ et $m = \mathbb{E}(X)$.

On a alors la limite suivante :

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Cela signifie que la moyenne des valeurs de X obtenues en réalisant n fois de façon indépendante la même expérience aléatoire, tend vers l'espérance de X en probabilité.

Preuve : On applique Bienaymé-Tchebychev à $\frac{S_n}{n}$.

Exercice : 15
(♥) Estimation d'une probabilité

On veut savoir si une pièce est équilibrée. On note p la probabilité d'avoir FACE.

Pour cela on lance n fois cette pièce et on note S_n le nombre de fois où on a obtenu FACE.

A partir de quelle valeur de n est-on assuré que la valeur obtenue pour $\frac{S_n}{n}$ est proche de p à 0,01 près avec une probabilité supérieure à 95 % ?

Exercice : 16
(*) Exercice 99 de la banque CCINP

Soit une variable aléatoire réelle $Y \in L^2$ et (Y_n) une suite de VA indépendantes suivant la loi de Y .

1. On pose $S_n = \sum_{k=1}^n Y_k$. Prouver que pour tout $a \in \mathbb{R}^{+*}$, on a :

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(Y_1)\right| \geq a\right) \leq \frac{V(Y_1)}{na^2}$$

2. On effectue des tirages successifs, avec remise, d'une boule dans une urne contenant 2 boules rouges et 3 boules noires.
A partir de quel nombre de tirages peut-on garantir à plus de 95 % que la proportion de boules rouges obtenues restera comprise entre 0,35 et 0,45 ?

6 Fonctions génératrices d'une VA naturelle

L'idée de cette partie est, pour X d'univers $\mathbb{N}$, de proposer une fonction simple permettant de retrouver rapidement :

- la loi de X
- l'existence et la valeur de $\mathbb{E}(X)$
- l'existence et la valeur de $\mathbb{V}(X)$
- ...

Nous aurons ici besoin de quelques résultats concernant les séries entières (vues dans un chapitre ultérieur !)

1. Préliminaires sur les séries entières :

DÉFINITION : Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de 0.

Lorsque f admet pour expression $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $] - R, R[$:

- on dit que la fonction f est *développable en série entière* au voisinage de 0.
- on dit que $] - R, R[$ est un *intervalle ouvert de convergence*.
- l'expression $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est appelé le *développement en série entière* de f . (DSE)

Exemples : Nous savons déjà que $e^t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} \quad \forall t \in \mathbb{R}$ et que $\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{+\infty} t^n \quad \forall t \in] - 1, 1[$.

THÉORÈME : Régularité

Lorsque $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $] - R, R[$:

- La fonction f est C^∞ sur $] - R, R[$.
- Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on obtient $f^{(k)}(x)$ en dérivant le terme général de la série.

$$\forall x \in] - R, R[, \quad f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$$

Preuve : En utilisant le théorème de transfert C^∞ par CVU des séries de fonctions.

COROLLAIRE :

Lorsque $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ sur $] - R, R[$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$

Quelques développements en série entière TRES utiles :

- $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ sur $\mathbb{R}$
- $\text{ch}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ sur $\mathbb{R}$
- $\text{sh}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ sur $\mathbb{R}$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ sur $] - 1, 1[$
- $\ln(1-x) = - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ sur $] - 1, 1[$

On remarque qu'en cas d'existence, les expressions des DSE correspondent à la partie régulière des développements limités de f au voisinage de 0. Cette propriété est vraie pour toute fonction C^∞ au voisinage de 0.

COROLLAIRE : S'il existe, le DSE d'une fonction est unique.

Ce corollaire sera en particulier utile pour retrouver la loi de X .

2. Fonction génératrice d'une VA

⚠ Les fonctions génératrices ne concernent que les Variables Aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$.

DÉFINITION : fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire naturelle.

Lorsque $\sum_{n \geq 0} P(X = n)t^n$ converge pour tout $t \in]-R_X, R_X[$, sa somme est appelée *fonction génératrice* de X .

Sa somme est notée G_X et on a alors pour tout $t \in]-R_X, R_X[$:

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n)t^n \quad \text{ou encore} \quad G_X(t) = \mathbb{E}(t^X)$$

PROPOSITION : Régularité de G_X

- Cette série converge normalement sur $[-1, 1]$.
- La fonction G_X est définie et continue sur au moins $[-1, 1]$ avec $G_X(1) = 1$
- La fonction G_X est C^∞ sur au moins $] -1, 1[$.

Preuve : Résultat vu en préliminaire.

Exemples : Il faut savoir retrouver rapidement ces différentes expressions

- Lorsque $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$: $G_X(t) = (1 - p) + pt$ et donc $R_X = +\infty$.
- Lorsque $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$: $G_X(t) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} t^k = (1 - p + pt)^n$ et donc $R_X = +\infty$.
- Lorsque $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$: $G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{(\lambda t)^n}{n!} = e^{\lambda(t-1)}$ et donc $R_X = +\infty$.
- Lorsque $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$: $G_X(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} p(1-p)^{n-1} t^n = \frac{pt}{1 - (1-p)t}$ et donc $R_X = \frac{1}{1-p}$.

Exemple : Retrouver l'expression de G_X pour une loi binomiale en utilisant la modélisation usuelle.

Soit $S_n = X_1 + \dots + X_n$ avec ...

PROPOSITION : Caractérisation des fonctions génératrices

Une fonction $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction génératrice d'une VA naturelle si et seulement si :

- f est développable en série entière sur au moins $[-1, 1]$: $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$
- La famille $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une distribution de probabilités discrète.

Preuve : Immédiat.

3. Application à la détermination de la loi de X :

PROPOSITION : Loi de X

- La loi de X détermine la fonction génératrice G_X .
- La fonction G_X détermine la loi de X : $\forall n \in \mathbb{N}, P(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$ ou $P(X = n) = a_n$.

Exemples : Vérifier que les f° génératrices des lois usuelles permettent effectivement de retrouver ces lois.

METHODES de détermination de la loi de X

- Si G_X est donnée par son DSE, on obtient la loi de X par identification (unicité du DSE).
- Si G_X est donnée par son expression avec les fonctions usuelles :
 - Si on peut, on recherche le DSE de G_X et on trouve $P(x = n)$ par identification.
 - Sinon, on applique la formule : $P(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$

Exemple : Vérifier que f définie par $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{2^{n+2}} t^n$ est la f° génératrice d'une variable naturelle X.
Déterminer la loi de X.

4. Application au calcul de l'ESPERANCE et de la VARIANCE :

Soit X une VA d'univers $\mathbb{N}$ de fonction génératrice G_X .

THÉORÈME : Espérance

$$X \text{ admet une espérance} \iff G_X \text{ est dérivable à gauche en } 1$$

Et dans ce cas : $G'_X(1) = \mathbb{E}(X)$.

Preuve : Sens direct :

Facile avec le théorème de transfert C^1 par CVU en posant $u_n(t) = P(X = n)t^n$.

- les u_n sont C^1 sur $[-1, 1]$ et $u'_n(t) = nP(X = n)t^{n-1}$.
- $\sum u_n$ converge simplement sur $[0, 1]$
- $\sum u'_n(t)$ CVN sur $[0, 1]$ car X admet une espérance et donc $\sum nP(X = n)$ converge.

Donc G_X est C^1 sur $[0, 1]$ et en particulier en 1 avec : $G'_X(1) = \sum_{n=0}^{+\infty} u'_n(1) = \mathbb{E}(X)$.

Preuve : Réciproque :

Comme G_X est dérivable en 1, $\Delta_1(t) = \frac{G_X(t) - G_X(1)}{t - 1}$ admet une limite finie pour $t \rightarrow 1^-$.

Or :

$$\Delta_1(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n) \frac{t^n - 1}{t - 1} = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n)(1 + t + \dots + t^{n-1})$$

Ruse : Pour tout $N > 0$, on a alors au voisinage de 1^- : $\sum_{n=0}^N P(X = n)(1 + t + \dots + t^{n-1}) \leq \Delta_1(t)$.

En faisant $t \rightarrow 1^-$, on obtient $\sum_{n=0}^N nP(X = n) \leq G'_X(1)$ ce qui donne la CVG de $\sum nP(X = n)$.

Exemples : Vérifier que les f° génératrices des lois usuelles permettent bien de retrouver les espérances.

THÉORÈME : Existence d'un moment d'ordre 2

$$X \text{ admet un moment d'ordre 2} \iff G_X \text{ est 2 fois dérivable à gauche en 1}$$

Dans ce cas, nous avons alors : $G_X''(1) = E(X(X-1))$

Preuve :

$\Rightarrow$ Avec le théorème de transfert C^2 par CVU.

$\Leftarrow$ Admise !

Méthode de détermination de la variance

Pour une variable X naturelle.

- On montre que $X \in L^2$ en vérifiant que G_X est D^2 à gauche en 1.
- On calcule alors $G_X''(1)$ pour obtenir $E(X(X-1))$.
- On obtient alors $E(X^2) = E(X(X-1)) - E(X) = G_X''(1) + G_X'(1)$.
Puis la variance avec la formule de Koenig-Huyghens :

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = G_X''(1) + G_X'(1) - (G_X'(1))^2$$

Exemples : Vérifier que les f° génératrices des lois usuelles permettent bien de retrouver les variances.

5. Fonction génératrice d'une somme :

Intérêt : Les fonctions génératrices sont très utiles pour étudier les sommes de VA indépendantes.

THÉORÈME : Lorsque X et Y sont INDEPENDANTES, nous avons :

$$G_{X+Y} = G_X \times G_Y \quad \text{sur au moins} \quad [-1, 1]$$

Preuve : Calculons $G_{X+Y}(t) = \mathbb{E}(t^{X+Y}) = \mathbb{E}(t^X t^Y) = \mathbb{E}(t^X) \mathbb{E}(t^Y)$ car t^X et t^Y sont indépendantes.

Plus généralement, lorsque $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes : $G_{X_1+\dots+X_n} = G_{X_1} \times \dots \times G_{X_n}$.

Exemples :

- Déterminer la fonction génératrice de $X \hookrightarrow B(n, p)$.
- Montrer que si $\begin{cases} X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda) \\ Y \hookrightarrow \mathcal{P}(\mu) \end{cases}$ sont indépendantes, alors $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda + \mu)$

Exercice : 17

(♥) Une urne contient 4 boules rapportant 0, 1, 1 et 2 points.

On y effectue n tirages d'une boule avec remise et on note S le score total obtenu.

Déterminer la fonction génératrice de S et en déduire la loi de S .

Voir l'exercice 110 de la banque CCINP.

6. Musculation : Somme aléatoire

La démonstration de ce théorème est tombée à l'oral de Saint-Cyr en 2019.

THÉORÈME : Soit N une VA à valeurs dans $\mathbb{N}$ et (X_n) une suite de VA indépendantes, suivant toute la loi de X .

La fonction génératrice de $S = \sum_{n=1}^N X_n$ est alors donnée par :

$$G_S(t) = G_N(G_X(t))$$

Preuve : On a $S(\Omega) = \mathbb{N}$.

- La formule des proba totales nous donne $P(S = n) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(N = k)P_{N=k}(X_1 + \dots + X_k = n)$.

- Donc $G_S(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} P(N = k)P_{N=k}(X_1 + \dots + X_k = n)t^n$.

- On vérifie facilement que cette famille est sommable et on applique Fubini :

$$G_S(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} (P(N = k) \sum_{n=0}^{+\infty} P(X_1 + \dots + X_k = n)t^n) = \sum_{k=1}^{+\infty} (P(N = k)G_{X_1+\dots+X_k}(t))$$

- Or l'indépendance des X_k nous donne $G_{X_1+\dots+X_k}(t) = (G_X(t))^k$ ce qui permet de conclure.

COROLLAIRE : Si N et X possèdent une espérance, on a alors : $\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X)$.

D/ On calcule $G'_S(1)$.