Les systèmes différentiels

Pascal DELAHAYE - d'après le cours de David Delaunay

20 mars 2025

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n .

I est un intervalle de $\mathbb{R}$.

DÉFINITION : On appelle EDL d'ordre 1 définie sur I et à valeurs dans E , toute équation d'inconnue x de la forme :

$$x' = a(t)(x) + b(t) \quad \text{où} \quad \begin{cases} t \mapsto a(t) \text{ est une application continue de } I \text{ dans } \mathcal{L}(E) \\ b : I \rightarrow E \text{ est continue} \\ x : I \rightarrow E \text{ est dérivable} \end{cases}$$

Remarque : Bien noter que $a(t)$ est un endomorphisme de E et que x est une fonction vectorielle à valeurs dans E .

Cas particulier

Lorsque $E = \mathbb{K}$, $a(t)$ est de la forme $a(t) : x \mapsto \alpha(t)x$.

On retrouve alors un type d'équation différentielle traitée en MPSI : $x' = \alpha(t)x + \beta(t)$.

En se plaçant dans une base e de E , on introduit les matrices associées à a , x et b et l'EDL1 s'exprime sous la forme :

$$(S) : X' = A(t)X + B(t) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A \\ B \end{cases} \text{ continues sur } I$$

Cette EDL1 se présente alors sous la forme d'un *système différentiel* (SDL1).

C'est en général sous cette forme que l'on donne ou que l'on traite la résolution des EDL1.

Table des matières

1	Systèmes différentiels d'ordre 1 (Cas général)	2
2	Système différentiel d'ordre 1 à coefficients constants	6
3	Equations scalaires d'ordre n	9
4	Résolution numérique d'un système différentiel	11

1 Systèmes différentiels d'ordre 1 (Cas général)

1. Définition :

DÉFINITION : **SDL1**

On appelle système différentiel linéaire d'ordre 1 d'inconnue $X \in \mathcal{C}^1(I, \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$, l'équation :

$$(S) : X' = A(t)X + B(t) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A \\ B \end{cases} \text{ continues sur } I$$

DÉFINITION : Résoudre (S) signifie :

« Déterminer toutes les fonctions $X \in \mathcal{D}^1(I, \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ vérifiant : $\forall t \in I, X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$ »

Exemples : (S) : $\begin{cases} x_1' = tx_1 + 2x_2 + e^t \\ x_2' = (1-t)x_1 + tx_2 \end{cases}$ s'écrit aussi $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} t & 2 \\ (1-t) & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^t \\ 0 \end{pmatrix}$.

PROPOSITION : Les solutions de $X' = A(t)X + B(t)$ sont des applications C^1 sur I .

Preuve : X' est somme et produit de fonctions continues.

2. Problème de Cauchy : on s'intéresse toujours à $X' = A(t)X + B(t)$ avec $\begin{cases} A \\ B \end{cases}$ continues sur I .

DÉFINITION : Soit $(t_0, X_0) \in I \times \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Le problème de Cauchy $\begin{cases} \text{associé à } (E) : X' = A(t)X + B(t) \\ \text{de condition initiale } X(t_0) = X_0 \end{cases}$ consiste à déterminer :
"les" solutions X de (E) vérifiant $X(t_0) = X_0$

Remarque : en MPSI on a vu que pour les EDL1 scalaires, le pb de Cauchy admettait une unique solution.

THÉORÈME FONDAMENTAL : **Théorème de Cauchy Linéaire**

Pour $(t_0, X_0) \in I \times \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Lorsque $\begin{cases} A \\ B \end{cases}$ sont C^0 sur I , le pbl de Cauchy $\begin{cases} X' = A(t)X + B(t) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$ admet une unique solution.

En d'autres termes, il existe une unique solution qui prend une valeur X_0 donnée en un t_0 donné.

Preuve : Hors-programme.

Par isomorphisme canonique, nous avons aussi l'unicité de la solution du problème de Cauchy : $\begin{cases} x' = a(t)x + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$

Exercice : 1

(♥) Soit $X' = A(t)X$ où la fonction $t \mapsto A(t)$ est continue et impaire sur $\mathbb{R}$.
Montrer que ce système différentielle admet une unique solution impaire.

💡 Applications usuelles de Cauchy-Linéaire

Le théorème de Cauchy-Linéaire permet de justifier l'unicité d'une sol^o vérifiant $X(t_0) = X_0$.
Il est en particulier souvent utilisé pour montrer :

- que deux solutions $\tilde{X}$ et $\tilde{Y}$ sont égales,
- qu'une solution $\tilde{X}$ est nulle,
- que le système admet une solution paire, impaire ou périodique,
- déterminer la dimension de S_H .

♡ Toute la suite de ce cours repose sur le théorème de Cauchy-Linéaire!

3. L'ensemble des solutions de (S) ?

On s'intéresse toujours à $(E) : X' = A(t)X + B(t)$ avec $\begin{cases} A \\ B \end{cases}$ deux fonctions continues sur I .

(a) Résolution de l'équation complète

THÉORÈME : L'ensemble des sol^o de (E) est un sous-espace affine de $\mathcal{C}^1(I, \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ de direction S_H :

$$X \in (E) \iff X = \tilde{X} + X_H \quad \text{où} \quad \begin{cases} \tilde{X} \text{ est une solution particulière de } (E) \\ X_H \text{ est la solution générale de } (H) \end{cases}$$

Preuve : Facile par équivalences successives.
Vous devez absolument savoir rédiger cette démonstration.

💡 Méthode théorique de résolution de (E)

On commence par reconnaître un SDL1, puis :

- On recherche l'ensemble des solutions homogène S_H .
- On recherche une solution particulière : $\tilde{X}$
- On conclut que les solutions sont les fonctions $X = \tilde{X} + X_H$ où $X_H \in S_H$.

Questions en attente de réponse :

- Quelle est la structure de S_H et donc de S ?
- Comment déterminer S_H ?
- Comment déterminer une solution particulière $\tilde{X}$?

(b) Equation homogène : $(H) : X' = A(t)X$

DÉFINITION : Les solutions de (H) sont appelées les solutions homogènes et leur ensemble est noté S_H .

LEMME : S_H est un sev de $\mathcal{C}^1(I, \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$

Preuve : S_H est le noyau d'une AL bien choisie.

THÉORÈME FONDAMENTAL : **Dimension du sev S_H**

- S_H est un sev de $\mathcal{C}^1(I, \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ de dimension n .
- $S = \tilde{X} + S_H$ est donc un sous-espace affine de $\mathcal{C}^1(I, \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K}))$ de dimension n .

Preuve : Soit $t_0 \in I$.

L'application $f : S_H \rightarrow \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est un isomorphisme d'après le théorème de Cauchy-Linéaire.
 $X \mapsto X(t_0)$

♡ *Retenir qu'on détermine la dimension de S_H grace au théorème de Cauchy-Linéaire.*

Détermination théorique de S_H

Il suffit donc de déterminer n solutions indépendantes pour obtenir TOUTES les solutions de S_H .

En général, ceci est plus facile à dire qu'à faire...

Exemple : L'ensemble des solutions de $\begin{cases} x' = a(t)x + b(t)y \\ y' = c(t)x + d(t)y \end{cases}$ est un plan vectoriel.

Pour résoudre ce système, une méthode consiste donc à rechercher 2 solutions indépendantes.

DÉFINITION : **Système fondamental de solutions de (H)**

Une base de S_H est appelée un *Système Fondamental de Solutions* (SFS) de :

$$(H) : X' = A(t)X$$

Un tel système est constitué de $n = \dim \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ fonctions solutions indépendantes de S_H .

PROPOSITION : **Solutions de (H)**

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ est un système fondamental de solutions de (H) .

La solution générale de (H) est alors :

$$X_H(t) = \lambda_1 X_1(t) + \dots + \lambda_n X_n(t) \quad \text{avec} \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$$

D/ Car $\dim S_H = n$.

Question : Comment déterminer un système fondamental de solutions de (H) ?

Il n'y a malheureusement pas de méthode systématique.

On y parvient lorsque $A(t)$ est diagonalisable ou trigonalisable dans une base INDEPENDANTE de t .

Une solution de $X' = A(t)X$ dans un cas particulier

Lorsque $A(t)$ admet un vecteur propre constant V .

On peut rechercher une solution sous la forme $X(t) = \alpha(t)V$ avec α une fonction dérivable sur I .

Preuve :

Exemple : Appliquer cette méthode pour trouver une solution du système $\begin{cases} x'_1 = (2-t)x_1 + (t-1)x_2 \\ x'_2 = 2(1-t)x_1 + (2t-1)x_2 \end{cases}$.

Méthode GÉNÉRALE de Résolution de $X' = A(t)X + B(t)$

- Méthode 1 : Si $A(t)$ est diagonalisable/trigonalisable avec P indépendante de t .

On se ramène à un nouveau système différentiel beaucoup plus simple à résoudre en posant :

$$Y = P^{-1}X$$

Cette méthode pourra en particulier être utilisée lorsque $A(t)$ est constante : $X' = AX + B(t)$

- Méthode 2 : Sinon, on se réfère à l'énoncé ou à son intuition pour trouver une SFS de (H)

→ L'énoncé peut nous proposer une démarche permettant de trouver une ou plusieurs solutions

→ On peut proposer une solution par intuition

→ On peut rechercher des solutions sous des formes qui nous semblent probables

Une fois un SFS obtenu, il nous reste encore à déterminer une solution particulière $\tilde{X}$.

Voir plus loin...

Preuve : Méthode 1

————— **Exercice : 2** —————

(*) Résoudre les systèmes différentiels suivants :

- $\begin{cases} x'_1 = (t+3)x_1 + 2x_2 \\ x'_2 = -4x_1 + (t-3)x_2 \end{cases}$ (diagonalisation)
- $\begin{cases} x'_1 = (1+t)x_1 + tx_2 \\ x'_2 = -tx_1 + (1-t)x_2 \end{cases}$ (trigonalisation)

Méthode de résolution de $(E) : X' = AX + B(t)$ (Cas où $A(t)$ est constante)

- Méthode 1 : On peut tenter de diagonaliser ou trigonaliser A (P sera bien indépendante de t)
- Méthode 2 : Nous verrons plus loin une formule générale qui donne les solutions de (H) .

————— **Exercice : 3** —————

(*) Résoudre le système $\begin{cases} x'_1 = 3x_1 - 2x_2 + e^t \\ x'_2 = x_1 + e^t \end{cases}$.

(c) Recherche d'une solution particulière :

Nous avons uniquement le théorème suivant à notre disposition :

PROPOSITION : Principe de superposition des solutions

Lorsque $B(t) = B_1(t) + B_2(t)$, on obtient une solution particulière de (E) en ajoutant :

$$\begin{cases} \text{une solution particulière de } X' = A(t)X + B_1(t) \\ \text{une solution particulière de } X' = A(t)X + B_2(t) \end{cases}$$

Preuve : Facile.

Remarque : Il existe cependant une méthode de *variation des constantes* vue dans l'exercice suivant et qui n'est plus au programme.

Exercice : 4**Méthode de variation des constantes**

On dispose ici d'un SFS $(X_1, \dots, X_n)$ de $X' = A(t)X$.

Montrer qu'il existe une solution particulière de $X' = A(t)X + B(t)$ sous la forme :

$$\tilde{X} = \lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_n X_n \quad \text{avec les } \lambda_k : I \rightarrow \mathbb{K} \text{ dérivables}$$

$$\heartsuit \text{ AVEC } \heartsuit : \quad \tilde{X} \text{ solution de } X' = A(t)X + B(t) \iff \lambda'_1 X_1 + \dots + \lambda'_n X_n = B$$

Preuve :

- $\tilde{X}$ solution $\iff \dots \iff \lambda'_1 X_1 + \dots + \lambda'_n X_n = B$.

- Cela nous donne un système linéaire de la forme :

$$U(t)\Lambda'(t) = B(t) \quad \text{avec } U(t) = (X_1(t) \dots X_n(t))$$

- Or pour tout $t \in I$, l'application $E_t : \begin{matrix} S_H & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X & \longmapsto & X(t) \end{matrix}$ est un isomorphisme.

Comme un isomorphisme transforme une base en une base et donc $U(t)$ est inversible.

- Le système donne alors $\Lambda'(t) = U(t)^{-1}B(t)$.

Comme la fonction $t \mapsto U(t)^{-1}B(t)$ est continue, on peut donc trouver les λ_k en primitivant.

2 Système différentiel d'ordre 1 à coefficients constants

Dans cette partie, la matrice $A(t)$ ne dépend plus de t .

DÉFINITION : On appelle *Equation linéaire d'ordre 1 à coefficient constant* définie sur I à valeurs dans E toute équation de la forme :

$$x' = a(x) + b \quad \text{avec } \begin{cases} a \in \mathcal{L}(E) \\ b : I \rightarrow \text{continue} \end{cases}$$

L'application linéaire a ne dépend plus de la variable t .

En se plaçant dans une base, on est ramené à un système différentiel à coefficients constants.

$$X' = AX + B(t) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K}) \\ B \in \mathcal{C}^0(I, \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K})) \end{cases}$$

1. Résolution théorique de l'équation homogène :

Rappels : Exponentielle d'une matrice en dimension finie

- Pour $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$, nous avons : $\exp(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!} \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\exp(0_n) = I_n$.
- $t \mapsto \exp(t.A)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et : $\frac{d}{dt}(\exp(tA)) = A \cdot \exp(tA)$.

THÉORÈME FONDAMENTAL : **Résolution de $X' = AX$**

Pour $A \in \mathfrak{M}_n(\mathbb{K})$.

L'ensemble des solutions homogènes est :

$$S_H = \{t \mapsto \exp(t.A)X_0 \mid X_0 \in \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K})\}$$

Ainsi, les solutions de $x' = a(x)$ sont : $x(t) = \exp(ta)(x_0)$ avec $x_0 \in E$.

Preuve : Vous devez être capable de refaire cette démonstration !

- $U_0 : t \mapsto \exp(t.A)X_0$ est bien dérivable et on obtient facilement $X' = AX$.
- On obtient facilement la deuxième inclusion grâce au théorème de Cauchy-Linéaire.

COROLLAIRE : **Solution du problème de Cauchy**

Pour $X_0 \in \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

L'unique solution au problème de Cauchy $\begin{cases} X' = AX \\ X(0) = X_0 \end{cases}$ est la fonction $X : t \mapsto \exp(tA)X_0$.

Preuve : On a bien $X(0) = X_0$.

Question : Quelle est la solution au problème de Cauchy $\begin{cases} X' = AX \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$?

Méthodes générales de résolution de $X' = AX + B(t)$

- Méthode 1 : On diagonalise/trigonalise A et on se ramène à un SDL1 simple à résoudre.
- Méthode 2 :
 - On applique la formule $X_H(t) = \exp(tA)X_0$ avec $X_0 \in \mathfrak{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.
 - On recherche une solution particulière par la méthode de variation de la constante X_0 . (HP ?)

2. Cas où A est diagonalisable :

Idée : On obtient les solutions de (H) en décomposant X_0 dans une base de vecteurs propres.

LEMME : Si V est vecteur propre de A associé à la valeur propre λ , on a :

$$\exp(tA)V = e^{\lambda t}V$$

Exemple

Si $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A associé à la valeur propre $\lambda = -5$ alors

$$t \mapsto e^{-5t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ est une solution particulière de } X' = AX$$

♡ En prenant des vecteurs propres de A indépendants on obtient des solutions indépendantes de S_H .

THÉORÈME FONDAMENTAL : Forme générale des solutions de S_H

Lorsque A est diagonalisable la solution générale de S_H est :

$$X_H(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} V_1 + \dots + \alpha_n e^{\lambda_n t} V_n \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \alpha_1, \dots, \alpha_n \text{ quelconques dans } \mathbb{K} \\ \lambda_1, \dots, \lambda_n \text{ les valeurs propres de } A \\ V_1, \dots, V_n \text{ une base de vecteurs propres} \end{cases}$$

Ou algébriquement :

En notant $(v_1, \dots, v_n)$ une base de vecteurs propres associés à $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, on obtient :

$$x_H(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + \dots + \alpha_n e^{\lambda_n t} v_n \quad \text{avec} \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$$

Preuve : Immédiat.

Méthode alternative de résolution de $X' = AX$ (Cas où A est diagonalisable)

La résolution de $X' = AX$ se limite à la diagonalisation de la matrice A .

Après avoir obtenu une base $(V_1, \dots, V_n)$ de vecteurs propres, on en déduit directement S_H .

Exemple : Résoudre $\begin{cases} x'_1 = 3x_1 - 4x_2 \\ x'_2 = 2x_1 - 3x_2 \end{cases}$

3. Cas où A n'est pas diagonalisable :

- Méthode 1 : On peut envisager de trigonaliser A .
- Méthode 2 : On peut envisager de calculer $\exp(tA)$.

Exemple ♡ : Résoudre $\begin{cases} x'_1 = 3x_1 + 2x_2 \\ x'_2 = -2x_1 - x_2 \end{cases}$ en appliquant chacune des deux méthodes précédentes.

Résolution de $X' = AX$ lorsque A est diagonalisable dans $\mathbb{C}$ (HP)

- On recherche les sous-espaces propres E_{λ_k} mais pas les $E_{\bar{\lambda}_k}$
- On obtient alors un système fondamental de solutions en considérant $\operatorname{Re}(e^{\lambda_k t} X_k)$ et $\operatorname{Im}(e^{\lambda_k t} X_k)$

Comme la démonstration de ce résultat est hors-programme, il faudra vérifier en pratique que les fonctions obtenues forment bien un SFS.

Exemple : Résoudre $\begin{cases} x'_1 = 3x_1 - 5x_2 \\ x'_2 = 2x_1 - 3x_2 \end{cases}$

Dans le cas des systèmes différentiels de taille 2, on peut aussi se ramener par analyse/synthèse à des EDL2 à coef constants (cf MPSI)

Voir l'exercice 74 de la banque CCINP.

3 Equations scalaires d'ordre n

1. Transformation en un SDL1 :

DÉFINITION : On appelle *Equation différentielle scalaire d'ordre n* une ED de la forme :

$$(E) : x^{(n)} = a_{n-1}(t)x^{(n-1)} + \dots + a_0(t)x + b(t) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} a_0, \dots, a_{n-1} : I \rightarrow \mathbb{K} \\ b : I \rightarrow \mathbb{K} \end{cases} \quad \text{continues}$$

PROPOSITION : Les solutions d'une telle équation sont C^n sur I .

D/ Evident !

Exercice : 5

(♥) Montrer que les solutions de (E) sont $C^\infty(I, \mathbb{K})$ lorsque les fonctions $a_0, \dots, a_{n-1}, b$ sont C^∞ sur I .

LEMME : Transformation en système différentiel

Soit $x : I \rightarrow \mathbb{K}$ n fois dérivable.

x est solution de (E) $\iff$ x est la composante x_1 d'un tuple $(x_1, \dots, x_n)$ solution du système :

$$\Sigma \begin{cases} x'_1 = x_2 \\ x'_2 = x_3 \\ \vdots \\ x'_{n-1} = x_n \\ x'_n = a_0(t)x_1 + \dots + a_{n-1}(t)x_n + b(t) \end{cases}$$

Preuve :

$\Rightarrow$ Supposons que x soit solution de l'EDLn.

$$\text{En posant } \begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = x' \\ \vdots \\ x_n = x^{(n-1)} \end{cases}, \text{ on a alors : } \begin{cases} x'_1 = x_2 \\ x'_2 = x_3 \\ \vdots \\ x'_{n-1} = x_n \\ x'_n = a_0(t)x_1 + \dots + a_{n-1}(t)x_n + b(t) \end{cases}.$$

x est donc la composante x_1 d'un tuple $(x_1, \dots, x_n)$ solution du système Σ .

$\Leftarrow$ Supposons que x_1 soit solution du système.

En substituant dans la dernière équation, on constate que x_1 est bien solution de (E).

Bien maîtriser cette technique de transformation afin de pouvoir appliquer la fonction `odeint()` de Python, ou plus simplement pour pouvoir résoudre une EDL d'ordre n à l'aide des méthodes développées dans les parties précédentes.

2. Problème de Cauchy :

On étudie (E) : $x^{(n)} = a_{n-1}(t)x^{(n-1)} + \dots + a_0(t)x + b(t)$ et on note Σ le système ci-dessus

DÉFINITION : Soit $(t_0, x_0, \dots, x_{n-1}) \in I \times \mathbb{K}^n$.

Un problème de Cauchy associé à (E) en t_0 consiste à déterminer les sol^o de (E) vérifiant les CI :

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \quad x^{(k)}(t_0) = x_k$$

Remarque : Ce problème se traduit en un problème de Cauchy associé au système Σ .

THÉORÈME : Il y a unicité de la solution au problème de Cauchy.

Preuve : Car le problème de Cauchy pour le système différentiel admet une unique solution.

3. Structure de l'ensemble des solutions :

(a) Equation homogène :

DÉFINITION : L'équation homogène associée à $x^{(n)} = a_{n-1}(t)x^{(n-1)} + \dots + a_0(t)x + b(t)$ est :

$$(H) : x^{(n)} = a_{n-1}(t)x^{(n-1)} + \dots + a_0(t)x$$

THÉORÈME : L'ensemble des solutions du système homogène est un sev de $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ de dimension n .

Preuve :

- **SEV** : On montre facilement que S_H est le noyau d'une application linéaire.
- **Dimension** : On considère $E_0 : S_H \rightarrow E$ définie par $x(t_0) = (x(t_0), \dots, x^{(n-1)}(t_0))$. C'est un isomorphisme d'après le théorème de Cauchy!

Ce résultat est essentiel car il permet de déterminer S_H dès lors qu'on connaît n solutions indépendantes.

(b) Equation complète :

THÉORÈME : L'ensemble S des solutions de (E) est un sous espace affine de $C^n(I, \mathbb{K})$ de direction S_H :

$$y = \tilde{y} + y_H \quad \text{où} \quad \begin{cases} \tilde{y} \text{ est une solution particulière} \\ y_H \text{ est la solution générale de } S_H \end{cases}$$

D/ Usuel.

Méthode générale de résolution d'un EDL d'ordre n

Pour résoudre $(E) : x^{(n)} = a_{n-1}(t)x^{(n-1)} + \dots + a_0(t)x + b(t) :$

- On résout l'équation homogène (en recherchant n solutions indépendantes)
- On recherche une solution particulière.
- On conclut.

4 Résolution numérique d'un système différentiel

Pour faciliter l'exposé, on se limite ici à la résolution d'un système différentielle à deux équations.

BUT : Résoudre numériquement $\begin{cases} x' = f(x, y, t) \\ y' = g(x, y, t) \end{cases}$ pour $t \in [t_0, t_N]$ avec pour CI : $\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$.

Remarques :

- Cette forme inclut le cas des SDL1 de taille 2×2 .
- Les méthodes suivantes se généralisent facilement à des systèmes $n \times n$

Le principe consiste :

- à discrétiser l'intervalle de temps $[t_0, t_N] : t_n = t_0 + np$ avec $p = \frac{t_N - t_0}{N}$ et $n \in \llbracket 0, N \rrbracket$

- à construire des suites $\begin{cases} (x_n) \\ (y_n) \end{cases}$ de sorte que :

→ en les reliant, les points $M_n(x_n, y_n)$ on obtient une approximation de la trajectoire du point $M(t) \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

→ en les reliant, les points $M_n(t_n, x_n)$ on obtient une approximation de la courbe de la solution x

→ en les reliant, les points $M_n(t_n, y_n)$ on obtient une approximation de la courbe de la solution y

💡 Méthode 1 : Avec l'algorithme d'Euler (Plutôt facile!)

Le système différentiel est ici défini par les deux fonctions f_1 et f_2 .

Pour construire la courbe intégrale passant par $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ en t_0 , les suites $\begin{cases} (x_n) \\ (y_n) \end{cases}$ sont définies par :

$$\begin{cases} x_0 \\ y_0 \end{cases} \quad \text{et pour tout } n \in \mathbb{N}^* \quad \begin{cases} x_{n+1} = x_n + pf_1(x_n, y_n, t_n) \\ y_{n+1} = y_n + pf_2(x_n, y_n, t_n) \end{cases}$$

```

Python
from matplotlib.pyplot import plot

def Euler(x0,y0,t0,tN,N,f1,f2):
    p = (tN-t0)/N
    x = [x0]
    y = [y0]
    t = [t0]
    for k in range(1,N+1):
        t.append(t[k-1]+p)
        x.append(x[k-1]+p*f1(x[k-1],y[k-1],t[k-1]))
        y.append(y[k-1]+p*f2(x[k-1],y[k-1],t[k-1]))
    plot(x,y) # ou plot(t,x) et plot(t,y)

```

Exemple : Résolution de $\begin{cases} x' = 2tx + t^2y + \cos(t) \\ y' = t^2x + 2ty + \sin(t) \end{cases}$ sur $[-1, 1]$ avec les conditions initiales $\begin{cases} x(-1) = -1 \\ y(-1) = -1 \end{cases}$.

```

Python
from matplotlib.pyplot import cos, sin

f1 = lambda x,y,t : 2*t*x+t**2*y+cos(t)
f2 = lambda x,y,t : 2*t*y+t**2*x+sin(t)

Euler(-1,-1,-1,1,100,f1,f2)

```

💡 Méthode 2 : Avec la fonction `odeint(F,[x0,y0],[t0,t1,t2,...,tN])` (Pour les spécialistes!)

On utilise ici la fonction `odeint` de la bibliothèque `scipy.integrate`.

- F définit le système différentiel.
Dans notre exemple, il s'agit de la fonction F :

$$F([x, y], t) = (f_1(x, y, t), f_2(x, y, t))$$

⚠ Syntaxe Python : $[x,y]$ est noté X et donc $x = X[0]$ et $y = X[1]$

- $[x_0, y_0]$ définit les CI, c'est à dire les valeurs de x et y en t_0 .
- $[t_0, t_1, t_2, \dots, t_N]$ définit l'intervalle de temps discrétisé.
Il s'agit d'une liste donnant les valeurs discrétisées de l'intervalle de variation de la variable t .
Pour définir cette liste, on utilise la commande `[t0 + k*p for k in range(N+1)]`.

La fonction `odeint` renvoie le tableau de points :

```
sol = array([[x0,y0], [x1,y1], ..., [xN,yN]])
```

On peut donc tracer la courbe intégrale en extrayant les listes $\begin{cases} x = \text{sol}[:,0] \\ y = \text{sol}[:,1] \end{cases}$ et en appliquant `plot(x,y)`.

```

Python
-----
from scipy.integrate import odeint
from matplotlib.pyplot import plot, cos, sin

x0 = -1          # Conditions initiales
y0 = -1

t0 = -1          # Intervalle de temps
tN = 1

N = 100          # Division de l'intervalle de temps
p = (tN - t0)/N  # Calcul du pas

F = lambda X,t:(2*t*X[0]+t**2*X[1]+cos(t),
                t**2*X[0]+2*t*X[1]+sin(t))      # Ne pas remplacer X par [x,y]

temps = [t0 + k*p for k in range(N+1)]

sol = odeint(F, [x0,y0], temps)
plot(sol[:,0],sol[:,1])                          # Bien noter la syntaxe !

```

Exercice : 6

(*) Solution numérique sur $[0, 3]$ de $y'' = 3ty' - \sin(t)y + \cos(t)$ avec les conditions initiales $\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$.