SYNTHESE : Les Groupes

I] Les Groupes et sous-groupes

Groupes de référence :

- Nombres : $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- Ensembles : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$
- Fonctions : $(\mathcal{F}(A, \mathbb{K}), +)$, $(\text{GL}(\mathbb{E}), \circ)$, $(\text{O}(E), \circ)$, $(\text{SO}(E), \circ)$, $(S_n, \circ)$.
- Matrices : $(\mathfrak{M}_n(\mathbb{R}), +)$, $(\text{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$, $(\text{O}_n(\mathbb{R}), \times)$, $(\text{SO}_n(\mathbb{R}), \times)$.

Pour tous ces groupes de référence, on oublie souvent de préciser la lci.
On parle ainsi du Groupe Symétrique S_n , du Groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou du Groupe $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Notation : un groupe quelconque est souvent simplement noté G et la composition de a et b : ab .

Pour montrer que $(G, \star)$ est un groupe

- Avec la définition :
 - $\star$ est une lci,
 - $\star$ est associative
 - Existence d'un élément neutre dans G pour $\star$
 - Existence d'un symétrique pour tout élément de G
- ♡ Avec les sous-groupes : On montre que $(G, \star)$ est un sous-groupe d'un groupe $(H, \star)$ connu
 - $G \subset H$
 - H non vide
 - Stabilité par $\star$: $x, y \in G \Rightarrow x \star y \in G$
 - Stabilité par symétrisation : $x \in G \Rightarrow x^{-1} \in G$

Cette méthode ne peut s'appliquer que si $\star$ est la lci d'un groupe connu. Pour l'appliquer, il faut donc connaître parfaitement les groupes de référence.

Notations :

- Lorsque la lci est notée $+$: $0_G, -x, nx$
- Sinon on utilise les notations : $1_G, x^{-1}, x^n$

Les sous-groupes usuels :

- Nombres :
 - $\mathbb{U}$, et $\mathbb{U}_n$ sont des sous-groupes usuels de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
 - $n\mathbb{Z}$ sont les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$
- Fonctions :
 - $(O(E), \circ)$ et $(SO(E), \circ)$ sont des sous-groupes usuels de $(GL(\mathbb{E}), \circ)$,
 - $\mathcal{A}_n$ (ensemble des permutations de signature 1) est un sous-groupe de $(S_n, \circ)$.
- Matrices : $(O_n(\mathbb{R}), \times)$, $(SO_n(\mathbb{R}), \times)$ et $(SL_n(\mathbb{R}), \times)$ sont des sous-groupes usuels de $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$
- Opérations : Pour un groupe G
 - L'intersection de sous-groupes de G est un sous-groupe de G
 - La somme de sous-groupes d'un groupe additif G est un sous-groupe de G
 - L'ensemble $\text{Vect}(A)$ des éléments engendrés par les éléments de $A \subset G$ est un sous-groupe de G

II] Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Définition :

- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ où $\bar{k}$ est une notation qui désigne l'ensemble des entiers congrus à k modulo n .
- On définit sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ les lci $\begin{cases} + \\ \times \end{cases}$ par : $\begin{cases} \bar{x} + \bar{y} = \overline{x+y} \\ \bar{x} \times \bar{y} = \overline{x \times y} \end{cases}$.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe commutatif fini
 - de cardinal n ,
 - d'élément neutre $\bar{0}$,
 - engendré par $\bar{1}$ et tous les éléments $\bar{k}$ tels que $k \wedge n = 1$

A savoir :

- Lien avec l'arithmétique : $x \equiv y [n] \iff \bar{x} = \bar{y}$ (Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)
- Les générateurs du groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les éléments $\bar{k}$ tels que $k \wedge n = 1$.

III] Le groupe $\mathcal{S}_n$

$(\mathcal{S}_n, \circ)$ est un groupe de cardinal $n!$ appelé le *groupe des permutations* de $[[1, n]]$.

A savoir :

Pour une permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \end{pmatrix} \in S_n$, vous devez être capable de déterminer

- sa représentation orbitale (et donc ses orbites)
- son support
- sa décomposition (unique et commutative) en produit de cycles de supports disjoints
- sa décomposition (non unique et non commutative) en produits de transpositions
- sa signature
- son ordre : le ppcm des cardinaux des différentes orbites
- ses inversions

Les différents types de permutations de S_n

- les cycles : $c = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p)$ (ordre p)
- les transpositions : $\tau = (x_1 \ x_2)$ (ordre 2)
- les permutations circulaires : $c = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)$ (ordre n)

IV] Les morphismes de groupes

Exemples usuels : $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$, $\varepsilon : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$

Pour montrer que $\varphi : H \rightarrow G$ est un morphisme de groupe

On montre que :

- $(H, \star)$ et $(G, \circ)$ sont deux groupes
- On pose $x, y \in H$ et on prouve que $\varphi(x \star y) = \varphi(x) \circ \varphi(y)$

Vocabulaire :

- On dit que le morphisme φ est un $\begin{cases} \text{Endomorphisme :} & \text{lorsque } \varphi : G \rightarrow G \\ \text{Isomorphisme :} & \text{lorsque } \varphi \text{ est bijectif} \\ \text{Automorphisme :} & \text{lorsque } \varphi : G \rightarrow G \text{ et est bijectif} \end{cases}$
- Lorsqu'il existe un isomorphisme $\varphi : H \rightarrow G$, on dit que G et H sont isomorphes.

Isomorphes ou pas ?

- Pour montrer que 2 groupes H et G sont isomorphes.

On procède par intuition :

→ On propose une application $\varphi : H \rightarrow G$

→ On montre que φ est un isomorphisme

- Pour montrer que $(G, +)$ et $(H, \star)$ ne sont pas isomorphes

→ On suppose qu'il existe un isomorphisme de l'un vers l'autre.

→ On considère 2 équations, équivalentes via cet isomorphisme : en général $\begin{cases} 2x = 0 \text{ dans } (G, +) \\ x^2 = 0 \text{ dans } (H, \star) \end{cases}$.

→ On montre que ces 2 équations n'ont pas le même nombre de solutions.

A savoir :

- Effectuer des calculs avec un morphisme : $\varphi(e_G), \varphi(a^n), \varphi(a^{-1})...$
- La composée de 2 morphismes est un morphisme
- Les noyaux et les images d'un morphisme sont des sous-groupes
- La bijection réciproque d'un isomorphisme est un isomorphisme
- Les images directe et réciproque d'un sous-groupe par un morphisme est un sous-groupe.
- Caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité d'un morphisme à l'aide de l'image et du noyau

Méthode : Recherche du noyau et de l'image de $\varphi : G \rightarrow H$

- ker φ : On recherche les antécédents de e_H par φ .

Pour cela, on résout l'équation $\varphi(x) = e_H$ dans G

- Im φ : On recherche l'ensemble des images.

Pour cela, on procède par analyse/synthèse...

→ Analyse : Soit $y = \varphi(x) \in \text{Im } \varphi$, alors ... et donc $y \in \Delta$

→ Synthèse : Soit $y \in \Delta$, vérifions s'il existe $x \in G$ tel que $y = \varphi(x)...$

... ou par intuition puis validation par double inclusion !

V] Les groupes monogènes

Il s'agit des sous-groupes $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ engendrés par un élément a d'un groupe G .

On distingue :

- Les groupes monogènes finis (de cardinal n) : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$, $U_n = \langle e^{\frac{2i\pi}{n}} \rangle...$

Ils sont isomorphes à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ via l'isomorphisme $\varphi_n : \begin{matrix} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \longrightarrow & \langle a \rangle \\ \bar{k} & \mapsto & a^k \end{matrix}$

Les groupes monogènes finis sont appelés des groupes cycliques.

- Les groupes monogènes infinis : $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, $n\mathbb{Z} = \langle n \rangle...$

Ils sont isomorphes à $\mathbb{Z}$ via l'isomorphisme $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \langle a \rangle \\ k & \mapsto & a^k \end{matrix}$

Exemples usuels de groupes monogènes :

- $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$
- $\mathbb{U}_n = \langle e^{i2\pi/n} \rangle$
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$

A savoir :

- Les groupes monogènes sont commutatifs
- Deux groupes cycliques (monogènes finis) de même cardinal sont isomorphes
- Les éléments générateurs d'un groupe monogène $\langle a \rangle$ de cardinal n sont les a^k avec $k \wedge n = 1$
- Les éléments générateurs d'un groupe monogène $\langle a \rangle$ infini sont a et a^{-1}

Monogène ou pas monogène ?

- Prouver qu'un groupe H est monogène :
On recherche un élément $h \in H$ tel que $H = \langle h \rangle$
- Prouver qu'un groupe H n'est pas monogène :
Souvent, on montre qu'il n'est pas commutatif

L'indicatrice d'Euler φ :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

- $\varphi(n)$ est le nombre d'entiers de $\llbracket 1, n \rrbracket$ premiers avec n .
- $\varphi(n)$ est le nombre de générateurs du groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
- $\varphi(n)$ est le nombre de générateurs de tout groupe monogène fini de cardinal n
- $\varphi(n)$ est le nombre d'éléments inversibles de l'anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ (voir le cours sur les anneaux)

Une expression de $\varphi(n)$ sera vue dans le cours sur les anneaux.

VI] L'ordre d'un élément

Lorsqu'il existe, l'ordre d'un élément $a \in G$ est le plus petit entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^p = e_G$.

Exemples :

- L'élément neutre est le seul élément d'ordre 1.
- i est d'ordre 4 et j est d'ordre 3 dans $\mathbb{U}$.
- 2 n'est pas d'ordre fini dans les groupes $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{R}, +)$.
- Les p -cycles sont d'ordre p et donc les transpositions sont d'ordre 2.
- Les permutations sont d'ordre le PPCM des cardinaux des différentes orbites de la permutation.
- Dans un groupe cyclique de cardinal n , un générateur est d'ordre n .

A savoir :

- Lorsque a est d'ordre p , on a $\langle a \rangle = \{e_G, a, \dots, a^{p-1}\}$ et $\langle a \rangle$ est de cardinal p .
- Lorsque $a^m = e_G$, l'ordre de a divise m .
- Dans un groupe fini G de cardinal n :
 - les éléments de G sont d'ordre fini
 - leur ordre divise n
 - $a^n = e_G$.

Méthode : Pour déterminer l'ordre d'un élément $a \in G$

- Si c'est possible, on calcule $a^2, a^3 \dots$ etc ... jusqu'à obtenir $a^p = e_G$
- Plus généralement, on procède par Analyse/Synthèse :
 - Analyse : Soit r l'ordre de a , alors ...
On trouve finalement un $p \in \mathbb{N}^*$ qui divise r et qui vérifie donc $p \leq r$
 - Synthèse : On vérifie alors que $a^p = e_G$ et donc $r \leq p$.
On en déduit finalement que $r = p$.

Démonstration à savoir :

Pourquoi tout groupe fini de cardinal p premier est-il cyclique ?

D/ Soit G un groupe de cardinal p premier :

- Les ordres des éléments de G divisent p donc valent 1 ou p .
- e_G étant le seul élément d'ordre 1, il existe donc un élément a d'ordre p
- nous avons alors $\langle a \rangle \subset G$ avec $\langle a \rangle = G$ et G de même cardinal.
- Par conséquent, $G = \langle a \rangle$ et donc G est un groupe monogène fini, c'est-à-dire un groupe cyclique.